

Weil髓鞘染色液

货号: AC11853

规格: 4×50mL

保存: 室温, 避光, 有效期1年

产品组成:

名称		4×50mL	保存
试剂(A): Weil 苏木素染色液	A1: Weil 苏木素 A	25mL	室温, 避光
	A2: Weil 苏木素 B	25mL	室温, 避光
取 A1、A2 等量混合即为 Weil 苏木素染色液, 不宜提前配制。			
试剂(B): 明矾溶液		50mL	室温, 避光
试剂(C): Weil 分化液		50mL	室温
试剂(D): Weil 蓝化液		50mL	室温

产品介绍:

髓鞘(Myelin Sheath)是包裹在神经细胞轴突外面的一层膜, 即髓鞘由髓鞘细胞和细胞膜组成, 是神经膜细胞的质膜沿着轴索的轴心螺旋缠绕形成的多层脂双层结构, 髓鞘上有郎飞氏结, 可使神经冲动跳跃传递。Weil 髓鞘染色可以显示病理情况下髓鞘是否完整、变性、坏死程度及修复情况, 对神经组织的病理诊断和研究均有意义, 例如神经纤维受损时, 髓鞘可出现膨胀、曲折成球形、断裂或脱鞘完全消失等改变。

操作步骤: (仅供参考)

1. 石蜡切片切 5-10um, 脱蜡至水。
2. 入配制好的 Weil 苏木素染色液, 置于温箱或水浴锅 56℃ 染色 20min, 蒸馏水冲洗。
3. 用明矾溶液分化, 并镜下控制区分正常髓鞘与灰质或变性区域, 蒸馏水冲洗。
4. Weil 分化液中完成分色 (清除背景), 蒸馏水冲洗。
5. 滴加 Weil 蓝化液处理, 充分水洗。
6. 常规脱水, 二甲苯透明, 中性树胶封固。

染色结果:

髓鞘	黑色
背景	无色

注意事项:

1. 此试剂盒简便快速, 明矾分化这一步很关键, 需在镜下观察分化程度。
2. 固定液以 10%的福尔马林为佳。
3. 置于温箱或水浴锅染色时, 应注意防止染色液挥发。
4. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。