

注射用垂体促卵泡素 (FSH)

货号: AC11455

规格: 100 单位

保存: 遮光, 密闭, 在凉暗处保存, 有效期 2 年。

性状: 白色或类白色的冻干块状或粉末。

药理作用: 在垂体促黄体素的协同作用下, 本品能促进卵巢卵泡生长发育和雌激素的分泌引起正常的发情。在大剂量连续刺激下, 可解除卵巢优势卵泡对其他小卵泡发育的抑制作用, 使卵巢形成多个成熟卵泡。

适应症: 用于治疗卵巢静止、持久黄体、卵泡发育停滞等。

用法与用量: 肌肉注射: 一次量, 马、驴 200-300 单位, 每日或者隔一日一次, 2-5 次为一个疗程; 乳牛 100-150 单位, 隔 2 日一次, 2-3 次为一个疗程。临用前, 以灭菌生理盐水 2-5ml 稀释。

超排, 肌肉注射: 牛总剂量 450~500 单位, 一日 2 次, 间隔 12 小时, 递减法连用 4 日; 山羊总剂量 180~220 单位, 一日 2 次, 递减法连用 3 日。

不良反应: 按规定的用法与用量使用尚未见不良反应。

注意事项:

- (1) 用药前, 必须检测查卵巢变化, 并以此修正剂量和用药次数。
- (2) 禁用与促生长, 用药前必须检查生殖机能是否正常, 正常者才能使用, 并根据母畜体重和胎次修正剂量。

相关文献:

[1] Liping Sun,Dong Li,Kun Song,et al. Exosomes derived from human umbilical cord mesenchymal stem cells protect against cisplatin-induced ovarian granulosa cell stress and apoptosis in vitro. Scientific Reports. May 2017. (IF 4.259)

产品仅供科研!

